

TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 06/06/2023, 07:23. CREA/SNCV ©2011-2023.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Azzano X (PN)

I-VCR 100

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Biotipo “Giallo” – Selezione “Petrussi”

✓ Vigoroso

✓ Fertilità reale buona


✓ Produttività inferiore

✓ Resistenza alla botrite buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	II decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo piccolo, semicompatto o meno, munito di una o due corte ali
- ✚ Acino piccolo, di colore giallo a volte dorato

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	2,00
Oidio	-


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	5,51
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	235,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE (*)**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,33
	pH	3,29
	Acidità totale (g/l)	7,67
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; profumo di fruttato; di buona struttura, freschi, sapidi; gusto persistente in bocca, retrogusto di mandorla amara; da utilizzare in purezza. Al taglio aggiungono struttura ed aromi; indicato il taglio con il VCR 33.

(*) Dati medi del triennio 1997-1999