

TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 09/05/2026, 15:20. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cos tutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Arzene (PN)

I-VCR 456

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Ubicazione | Rauscedo (PN) |
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Guyot |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 3333 |
| Periodo di osservazione | 2007-2009 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione contenuta, ma costante ed omogenea

FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|----------------|--------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | III decade Maggio |
| Invaiaura | III decade Luglio |
| Maturazione | I decade Settembre |

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo piccolo, cilindrico-piramidale, semicompatto, con due corte ali di cui una spesso più sviluppata
- ✚ Acino medio-piccolo, sferoide, con buccia di colore giallo dorato con riflessi verdognoli



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|---------|------|
| Botrite | 0,83 |
| Oidio | 0,67 |


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

| | |
|-------------------------------|------|
| Fertilità reale | 1,36 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 2,98 |
| Numero grappoli/ceppo | 17,6 |
| Peso medio grappolo (g) | 169 |
| Peso medio acino (g) | 1,7 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | 670 |
| Indice di Ravaz | 4,44 |

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| MOSTO | Zuccheri (Babo) | 18,50 |
| | pH | 3,28 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,33 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | 5,63 |
| | Ac. Malico (g/l) | 3,01 |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di ottima struttura ed acidità, profumati, freschi, con un piacevole retrogusto di mandorla. Da utilizzare sia in purezza che in uvaggio.