

TREBBIANO DI SOAVE B.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 03:53. CREA/SNCV ©2011-2025.



Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti
Ortoflorovivaistici Veronesi;
Provincia di Verona - Servizio Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 258 del 06/11/2014

Origine

Località San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda
(VR)

I - VITIVER 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità leggermente inferiore
- ✓ Produttività minore
- ✓ Maggiore accumulo di zuccheri

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- 🍇 Grappolo di dimensioni medie



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	4,12
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	422,19
Peso medio acino (g)	2,47
Peso legno potatura (g/ceppo)	870
Indice di Ravaz	4,74

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	22,26
	pH	3,35
	Acidità totale (g/l)	6,56
	Ac. Tartarico (g/l)	5,70
	Ac. Malico (g/l)	2,12

ANALISI SENSORIALE (*)



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il *Trebbiano di Soave I-VITIVER 1* si caratterizza, rispetto al testimone, per avere una superiore intensità aromatica complessiva (floreale e note di limone), mantenendo una buona acidità che conferisce freschezza al vino. Per queste caratteristiche è un clone idoneo alla produzione di vini d'annata e se raccolto tardivamente anche alla produzione di vini di maggior struttura e longevità.

(*) Dati medi relativi al biennio 2009-2010