

# TREBBIANO DI SOAVE B.

Documento aggiornato al: 30/11/2021, 04:02. CREA/SNCV ©2011-2021.



Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti  
Ortoflorovivaistici Veronesi;  
Provincia di Verona - Servizio Agricoltura

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**  
G.U. n. 258 del 06/11/2014

## Origine

Località San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda  
(VR)

I - VITIVER 1

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità leggermente inferiore
- ✓ Produttività minore
- ✓ Maggiore accumulo di zuccheri

### FASE FENOLOGICA

### EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

### SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

### CLONE

### CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

## IL GRAPPOLO


- 🍇 Grappolo di dimensioni medie



<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>	<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	4,12
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	422,19
Peso medio acino (g)	2,47
Peso legno potatura (g/ceppo)	870
Indice di Ravaz	4,74

	<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>	<b>CLONE</b>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (°Brix)	22,26
	pH	3,35
	Acidità totale (g/l)	6,56
	Ac. Tartarico (g/l)	5,70
	Ac. Malico (g/l)	2,12

### **ANALISI SENSORIALE (\*)**



### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Il *Trebbiano di Soave I-VITIVER 1* si caratterizza, rispetto al testimone, per avere una superiore intensità aromatica complessiva (floreale e note di limone), mantenendo una buona acidità che conferisce freschezza al vino. Per queste caratteristiche è un clone idoneo alla produzione di vini d'annata e se raccolto tardivamente anche alla produzione di vini di maggior struttura e longevità.

(\*) Dati medi relativi al biennio 2009-2010