TREBBIANO TOSCANO B.

Documento aggiornato al: 27/10/2025, 09:54. CREA/SNCV ©2011-2025.



Cosminiore

Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico; Dipartimento di Biotecnologie – Cattedra di Viticoltura – Università degli Studi di Verona; C.I.V.V. AMPELOS

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 258 del 06/11/2014

Origine

San Benedetto Po' (MN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Monzambano (MN)

Forma di allevamento Spalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 4630

Periodo di osservazione 2009-2011


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità inferiore
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Marzo
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	II-III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo lungo, di forma conica, mediamente compatto, con presenza di 1-2 ali
- Acino medio-corto, sferoidale, con buccia di colore verde giallo mediamente pruinosa




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,65
Produzione per ceppo (Kg)	4,85
Numero grappoli/ceppo	10
Peso medio grappolo (g)	485
Peso medio acino (g)	1,96
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
	Zuccheri (°Brix)	19,86
9	рН	3,19
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,67
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE





DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Nel 2010 il vino ha presentato elevata intensità olfattiva e gradevole tonalità di colore, con note di frutta matura, frutta tropicale e buona alcolicità.

Nel 2011 rispetto al *Trebbiano Toscano R 4* (clone di confronto), presenta una minore intensità e tonalità colorante e una minor sensazione di frutta matura, ma risulta maggiormente percepibile una nota di agrumato.

