

VERDICCHIO BIANCO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:23. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

I-VCR 3

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

S. Bonifacio (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo “Trebbiano di Soave”
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività leggermente inferiore e costante
- ✓ Buona la resistenza alla botrite e all’oidio

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio, semicompatto
- ▣ Acino più che medio, con buccia abbastanza consistente



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	1,0
Oidio	2,5

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE


Fertilità reale	1,34
Produzione per ceppo (Kg)	4,15
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	308,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE (*)

ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,37
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	9,53
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di elevata struttura fruttati, da invecchiamento. Si presta all'uvaggio apportando notevole complessità aromatica.

(*) Dati relativi al triennio 1997-1999