

VERDISO B.

Documento aggiornato al: 07/06/2026, 09:23. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Valdobbiadene (TV)

I-**ISV-V 2**

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Valdobbiadene (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1982-1985

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** più piccolo
- ✓ **Acino** con buccia leggermente più consistente
- ✓ Fertilità media-superiore
- ✓ Produttività media


FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✘ Grappolo tendenzialmente spargolo
- ✘ Acino medio, ellissoidale; buccia di un bel colore giallo paglierino



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

**CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,55
Produzione per ceppo (Kg)	9,4
Numero grappoli/ceppo	52
Peso medio grappolo (g)	180,8
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	17,17
	pH	3,01
	Acidità totale (g/l)	9,10
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino scarico; vinificato in purezza risulta di buona qualità, fresco di acidità e di buon profumo, tipico e caratteristico della zona.

Da utilizzarsi per la produzione di vini tranquilli o frizzanti.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Da utilizzare in terreni non troppo fertili, dove tende a compattare troppo il grappolo.
