

VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 24/06/2026, 18:04. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 273 del 22/11/1994

Origine

Camino al Tagliamento (UD)

I-VCR 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ubicazione | Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE) |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | 1990-1992 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso minore
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Produzione non elevata, ma costante
- ✓ Fertilità media
- ✓ Ottima la resistenza alla botrite

| <i>FASE FENOLOGICA</i> | <i>EPOCA</i> |
|------------------------|---------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiaura | III decade Agosto |
| Maturazione | II decade Settembre |

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo piccolo, un po' spargolo, piramidale, con corte ali
- ✚ Acino medio, di colore giallo ambrato



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE**

| | |
|-------------|------|
| Botrite (*) | 1,63 |
| Oidio (**) | 4,3 |


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

| | |
|-------------------------------|------|
| Fertilità reale | 1,51 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 9,66 |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | 161 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE**

| | | |
|--------------|----------------------|------|
| MOSTO | Zuccheri (Babo) | 17,3 |
| | pH | 3,21 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,35 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino con profumi, aromi e sapori, molto più evidenti che in altri biotipi. Migliora con leggero invecchiamento e si presta al taglio con vini di qualità, anche passiti.

Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (*) e Città Sant'Angelo (PE) (**)