

VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:22. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

Nimis (UD)

I-VCR 200

CAMPO DI OMOLGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo a germoglio rosato
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Produttività contenuta
- ✓ Buona la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo più che medio, semicompatto
- ▣ Acino medio o meno, a buccia consistente



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	1,5
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,42
Produzione per ceppo (Kg)	5,91
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	239
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI


ENOCHIMICI

MOSTO

CLONE (*)

Zuccheri (Babo)	18,20
pH	3,25
Acidità totale (g/l)	7,43
Ac. Tartarico (g/l)	-
Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di buona alcolicità ed acidità, nonché di struttura, il profilo aromatico floreale denota una finezza ed una eleganza particolare. Per consumo fresco.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999