

VERDUZZO TREVIGIANO B.

Documento aggiornato al: 01/09/2024, 01:00. CREA/SNCV ©2011-2024.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Conegliano (TV)

I-**ISV**-V 5

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ubicazione | Spresiano (TV); Monastier (TV) |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 1500 |
| Periodo di osservazione | 1982-1985 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria equilibrata
- ✓ Fertilità buona, inclusa quella delle gemme basali
- ✓ Produttività media

FASE


EPOCA

FENOLOGICA

| | |
|----------------|-------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | I decade Giugno |
| Invaiaura | III decade Agosto |
| Maturazione | I decade Ottobre |

IL GRAPPOLO

- 🍇 Grappolo medio-grande, piramidale, alato
- 🍇 Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|---------|---|
| Botrite | - |
| Oidio | - |

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

| | |
|----------------------------------|-------|
| Fertilità potenziale delle gemme | 1,57 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 8,8 |
| Numero grappoli/ceppo | 47,6 |
| Peso medio grappolo (g) | 184,9 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

| | | |
|--------------|----------------------|-------|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | 17,60 |
| | pH | 3,26 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,4 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; aroma caratteristico, delicato ed elegante; sapore asciutto, morbido, leggermente amarognolo, sapido; di buona tipicità.