VERMENTINO B.

Documento aggiornato al: 19/11/2026, 04:16. CREA/SNCV ©2011-2026.

Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 133 dell' 11/06/2018.

Origine
Az. Bernardi, S. Maria La Palma (SS)

I-VCR 147

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Domenico Bordone, loc. S. Agnese, Monteu Roero (CN).
Forma di allevamento e Portinnesto	Guyot con 9 gemme/pianta; Kober 5BB VCR 102.
Sesto e Densità di impianto	0,8 x 2,3 m.; 5434 ceppi/ha.
Periodo di osservazione	2011-2013

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria	Buona
✓ Fertilità	Superiore alla media varietale
✓ Produttività	Buona e costante

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade di Aprile
Fioritura	I decade di Giugno
Invaiatura	I decade di Agosto
Vendemmia	II decade di Settembre

IL GRAPPOLO

Grappolo medio, cilindrico-piramidale, allungato, semispargolo, con due corte ali.

Acino grande, ovoide, con buccia mediamente consistente, di colore giallo-dorato con riflessi ambrati.

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE (*)
Botrite	0,43
Oidio	0,50

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)
Fertilità basale	1,40
Fertilità reale	1,45
Fertilità potenziale	1,81
Produzione per ceppo (Kg)	3,84
Peso medio grappolo (g)	289
Peso medio acino (g)	2,2
Peso legno potatura (g/ceppo)	970
Indice di Ravaz	3,96

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO (*)	Zuccheri (Babo)	18,62
	pH	3,37
	Acidità totale (g/l)	6,20
	Acido tartarico (g/l)	5,17
	Acido malico (g/l)	1,48
VINO (**)	Grado alcolico	12,69
	Acidità totale (g/l)	5,78
	pH	3,18
	Estratto netto (g/l)	18,15

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Si ottengono vini di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si percepiscono delicate note floreali che sfociano sul fruttato-tropicale, accompagnate da leggeri sentori speziati e lievemente erbacei. In bocca si denota l'ottimo equilibrio gustativo tra il corpo e l'acidità, sapido e persistente si adatta sia alla vinificazione per vini fermi che alla spumantizzazione.



(*) Dati medi relativi al triennio di osservazione
(**) Dati medi relativi al biennio 2012/2013