

RUCHÈ N.

Documento aggiornato al: 12/02/2026, 05:44. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per
il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

I-CVT 10

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 295 del 19/12/1994

Origine

Castagnole M.to (AT)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Castagnole M.to (AT)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	4000
Periodo di osservazione	1988-1992

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività elevata
- ✓ Moderata suscettibilità verso la peronospora

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Media
Fioritura	Medio-precoce
Invaiatura	Media
Maturazione	Medio-precoce



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio-grande, piramidale allungato, con due ali, compatto
- ❖ Acino medio-piccolo, ellisoidale corto, molto pruinoso

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE		CLONE
Fertilità reale	2,0	
Produzione per ceppo (Kg)	5,5	
Numero grappoli/ceppo	24	
Peso medio grappolo (g)	233	
Peso medio acino (g)	1,56	
Peso legno potatura (g/ceppo)	680	
Indice di Ravaz	8,0	

PARAMETRI ENOCHIMICI		CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,6
	pH	3,25
	Acidità totale (g/l)	5,40
	Ac. Tartarico (g/l)	6,31
	Ac. Malico (g/l)	1,21
VINO	Antociani totali (mg/l)	170 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.320 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso granato intenso; all'olfatto emergono note di rosa e soprattutto viola, di spezie e note fruttate di ciliegia; al gusto presenta buona acidità e discreta struttura.

(*) Dati medi relativi al periodo 1990-1992