

REGINA B.

Documento aggiornato al: 02/06/2026, 11:38. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Province di Bari e Foggia

9 VASI-I
6

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1973-1977

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Acino** con buccia sottile e quasi impercettibile al gusto
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona

FASE


EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo grosso, cilindrico, allungato, mediamente spargolo, alato, con peduncolo visibile
- ✿ Acino grosso, di forma cilindrica irregolare (allungato, a volte reniforme e arcuato o a pera); buccia pruinosa, tenera, di colore giallo, polpa croccante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità potenziale delle gemme	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	18,2
Numero grappoli/ceppo	46
Peso medio grappolo (g)	394,2
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	16,0
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	9,95
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA
