Documento aggiornato al: 21/10/2025, 11:43. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Province di Bari e Foggia

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN)

Forma di allevamento
Densità di impianto (ceppi/ha)
Periodo di osservazione 1973-1977


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Acino** con buccia sottile e quasi impercettibile al gusto
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona

FASE	E POCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	II decade Giugno	
Invaiatura	I decade Agosto	
Maturazione	II decade Ottobre	

IL GRAPPOLO

- Grappolo grosso, cilindrico, allungato, mediamente spargolo, alato, con peduncolo visibile
- Acino grosso, di forma cilindrica irregolare (allungato, a volte reniforme e arcuato o a pera); buccia pruinosa, tenera, di colore giallo, polpa croccante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	18,2
Numero grappoli/ceppo	46
Peso medio grappolo (g)	394,2
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	16,0
9	рН	-
MOST	Acidità totale (g/l)	9,95
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA