

# REGINA B.

Documento aggiornato al: 17/02/2026, 06:52. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,  
Conegliano (TV)

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**  
G.U. n. 300 del 31/10/1980

## Origine

Province di Bari e Foggia

I-  
ISV  
6

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1973-1977


## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Acino** con buccia sottile e quasi impercettibile al gusto
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona

FASE	EPOCA
<b>FENOLOGICA</b>	
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo grosso, cilindrico, allungato, mediamente spargolo, alato, con peduncolo visibile
- ❖ Acino grosso, di forma cilindrica irregolare (allungato, a volte reniforme e arcuato o a pera); buccia pruinosa, tenera, di colore giallo, polpa croccante



---

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE****CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

---

**CARATTERISTICHE CLONE****PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	18,2
Numero grappoli/ceppo	46
Peso medio grappolo (g)	394,2
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

---

**PARAMETRI CLONE****ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	16,0
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	9,95
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

---

**ANALISI SENSORIALE**

---

**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**