Documento aggiornato al: 21/10/2025, 11:44. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Province di Bari e Foggia

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN)

Forma di allevamento
Densità di impianto (ceppi/ha)
Periodo di osservazione 1973-1976


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Acino** con buccia più consistente e polpa piuttosto succosa
- ✓ Produttività buona e costante

FASE	E POCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	II decade Giugno	
Invaiatura	I decade Agosto	
Maturazione	II decade Ottobre	

IL GRAPPOLO

- Grappolo grosso, cilindrico, mediamente compatto, alato, con peduncolo visibile semilegnoso
- Acino grosso, di forma da sferica ad ovoidale; buccia di medio spessore, di colore verde-giallastro; polpa da croccante-carnosa a succosa



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	0,88
Produzione per ceppo (Kg)	17,8
Numero grappoli/ceppo	44,8
Peso medio grappolo (g)	397,4
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	14,90
9	рН	-
MOSTO	Acidità totale (g/l)	9,51
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA