

CHENIN B.

Documento aggiornato al: 22/12/2025, 00:14. CREA/SNCV ©2011-2025.

Costitutore



CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
Vivai Cooperativi Rauscedo

I-SV-R 4

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

FPMS - Davis University Ca.

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1995-1997

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, semicompatto, conico, con due corte ali
- ✿ Acino medio, con buccia fine

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	4,17
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	7,01
Numero grappoli/ceppo	34,7
Peso medio grappolo (g)	201,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE

ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	15,4
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	9,68
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Alla degustazione sono risultati preminent i caratteri di finezza, intensità e persistenza.