Documento aggiornato al: 23/11/2026, 16:29. CREA/SNCV ©2011-2026.

SCHEDA INCOMPLETA

IN ATTESA DI ULTERIORI DATI NON ANCORA TRASMESSI DAL COSTITUTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

crea SNCV

CARDINAL N.



Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (TV);
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 295 del 19/12/1994

Origine
Trinitapoli (BA)

I- ISV-VCR 26

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	-

IL GRAPPOLO

Medio-grande, tronco-piramidale.

- ***ACINO:*** grande, sferoide.
- ***VINACCIOLI:***



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio superiore
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione ottima e costante

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI	*CLONE*
Fertilità reale	-
Produzione (Kg/ceppo)	-
N° grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO	*CLONE*
Zuccheri (°Brix)	-
pH	-
Acidità totale (g/l)	-
Grado di spedicellamento (gr)	(*)
Forza di schiacciamento (gr/cm²)	(*)

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Il clone richiede climi temperato-caldi e si adatta ai diversi sistemi di allevamento.

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Il clone manifesta una resistenza media nei confronti della botrite e dell'oidio.

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

(*) Il clone presenta un indice di distacco e di schiacciamento leggermente superiore alla media.