Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:16. CREA/SNCV ©2011-2025.





Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n.106 del 07.05.2022

Origine Ortona (CH)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Bitetto (BA)

Forma di allevamento Tendone

Portinnesto Kober 5BB

Sesto e Densità di impianto 2,5 m x 2,5m – (≈ 1600 ceppi/ha)

Periodo di osservazione 2015-2017

Testimone di riferimento Pizzutello b. standard

IL GRAPPOLO

Grappolo di dimensioni in linea con la media della popolazione o leggermente superiore, spargolo, cilindrico-piramidale, con una o due ali.

- ACINO: L'acino è di media grandezza, caratterizzato dalla tipica forma allungata, appuntita e leggermente arcuata, con buccia abbastanza sottile e pruinosa, di colore verde-giallo. Il pedicello è mediocorto, la polpa è croccante, carnosa, di sapore neutro ma gradevole, abbastanza dolce
- VINACCIOLI: sono mediamente presenti uno-due vinaccioli, allungati, piriformi



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo:** medio-grande

✓ Acino: medio, dalla tipica forma allungata ed arcuata

✓ **Vigoria:** media

✓ Fertilità: media

✓ **Produttività:** media o superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade aprile
Fioritura	I decade giugno
Invaiatura	I decade agosto
Maturazione	II-III decade settembre

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI	CLONE	PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI	CLONE
Fertilità reale	1,43	DELL'ACINO	
Produzione (Kg/ceppo)	16,49	Zuccheri (°Brix)	17,6
N° grappoli/ceppo	46	рН	3,41
Peso medio grappolo (g)	362	Acidità totale (g/l)	4,9
Peso medio acino (g)	4,17	Grado di spedicellamento	365
Peso legno potatura	2967	(gr)	
(g/ceppo)		Forza di schiacciamento	1635
Indice di Ravaz	5,6	(gr/cm²)	

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Il clone presenta buona adattabilità alle diverse condizioni pedo-climatiche.

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

UTILIZZAZIONE

Il biotipo scelto presenta un grappolo di dimensioni in linea con la popolazione o leggermente superiore, spargolo, cilindrico-piramidale, con una o due ali. L'acino è di media grandezza, caratterizzato dalla tipica forma allungata, appuntita e leggermente arcuata, con buccia abbastanza sottile e pruinosa, di colore verde-giallo. Il pedicello è medio-corto, la polpa è croccante, carnosa, di sapore neutro ma gradevole, abbastanza dolce; sono mediamente presenti uno-due vinaccioli, allungati, piriformi. La fertilità è nella media della varietà. Possiede una buona resistenza allo spedicellamento, il che rende il biotipo piuttosto adatto alla conservazione e alla manipolazione durante il confezionamento e trasporto.

