LIATIKO N.

Documento aggiornato al: 14/11/2026, 19:26. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 170 del 23/07/2011

Origine
Creta - Grecia

I-VCR 295

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2005-2007

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona, compresa quella basale
- ✓ Produttività buona
- ✓ Ottima dotazione di antociani



FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

IL GRAPPOLO


- Grappolo cilindrico, allungato, semicompatto, con due ali evidenti
- Acino leggermente ovoide, con buccia di colore violaceo, con lieve retrogusto moscato

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	0,67
Oidio	0,83

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	3,44
Numero grappoli/ceppo	13,8
Peso medio grappolo (g)	249
Peso medio acino (g)	1,95
Peso legno potatura (g/ceppo)	750
Indice di Ravaz	4,59

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,67
	pH	3,27
	Acidità totale (g/l)	6,20
	Ac. Tartarico (g/l)	4,97
	Ac. Malico (g/l)	1,70
VINO	Antociani totali (mg/l)	351(*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.924 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2005-2006

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso vivo ad alta gradazione alcolica. Si presta alla vinificazione in purezza o in mescola con altri vitigni locali o esteri. Le uve di questo biotipo si prestano anche all'appassimento grazie alla buccia consistente per ottenere vini da dessert.