MERERA N.

Documento aggiornato al: 25/11/2026, 06:14. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Istituto di Coltivazioni Arboree - Istituto di Patologia Vegetale , Università degli Studi di Milano

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 106 del 07/05/2022

Origine

Franciacorta (BS)

I-BS-C 1


CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- Fertilità: media
- Produttività: media

FASE FENOLOGICA	EPOCA
- Germogliamento	-
- Fioritura	-
- Invaiatura	-
- Maturazione	-



IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-grande, allungato, piramidale, alato e spargolo
- Acino medio, rotondeggiante

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
Zuccheri (°Brix)	-
pH	-
Acidità totale (g/l)	-
Ac. Tartarico (g/l)	-
Ac. Malico (g/l)	-
Antociani totali (mg/l)	-
Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso, con sentori erbacei non tipici e poco marcati; struttura media ed equilibrata. Il clone caratterizzato da un corredo aromatico interessante e particolare, si dimostra utile negli uvaggi.