ARNEIS B.

Costitutore
Istituto di Virologia Vegetale – Unità di Grugliasco (TO) (già Centro Studio Miglioramento Genetico e Biologia della Vite) – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Responsabile selezione: F. Mannini

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 171 del 24/07/1987
Origine
S. Stefano Roero (CN)

I-CVT - CN 32

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Neive (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	4000
Periodo di osservazione	1980-1982

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività medio-elevata e costante

Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	Medio
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

Il Grappolo

- Grappolo medio-grande, conico-piramidale, medio-corto, con due ali, talora composto, compatto
- Acino medio, elissoidale corto; buccia pruinosa, di colore giallo

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
Botrite	Media
Oidio	Media

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	3,50
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	220,00
Peso medio acino (g)	1,69
Peso legno potatura (g/ceppo)	620
Indice di Ravaz	5,64

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	20,5
	pH	3,12
	Acidità totale (g/l)	8,20
	Ac. Tartarico (g/l)	7,50
	Ac. Malico (g/l)	2,80

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore giallo paglierino scarico; fine profumo fruttato, tipico; di adeguata alcolicità (11.7 %) e struttura, possiede buona sapidità ed armonia, acidità sufficiente a fornire freschezza (pH 3.09).