BIANCAME B.

Costitutore
Vivai Cooperativi di Rauscedo
Via Udine, 39 – 33095 – Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda.

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 132 del 07/06/2019

Origine
Az. Agr Fiorini, Barchi (PU).

I-VCR 352

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Giuseppe Migliani, Arielli (CH)
Forma di allevamento e Portinnesto	Guyot con 9 gemme/pianta; KOBER 5BB VCR 102.
Sesto e Densità di impianto	1,25 x 2,5 m; 3200 ceppi/ha.
Periodo di osservazione	2009/2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria	Buona
✓ Fertilità	Leggermente inferiore alla media varietale
✓ Produttività	Contenuta

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade di Aprile
Fioritura	III decade di Maggio
Invaiatura	II decade di Agosto
Maturazione	

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, cilindrico, allungato, semi-spargolo, con due corte ali, poco sensibile alla botrite.
- Acino medio-grosso, sferoide, con buccia giallo-dorata.



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE (**)
Botrite	0,67
Oidio	0,50

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (**)
Fertilità basale	1,39
Fertilità reale media	1,47
Fertilità potenziale	1,63
Produzione per ceppo (Kg)	4,48
Peso medio grappolo (g)	340
Peso medio acino (g)	2,44
Peso legno potatura (g/ceppo)	990
Indice di Ravaz	4,53

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (*)
VINO	Grado alcolico	12,65
	pH	3,33
	Acidità totale (g/l)	6,15
	Estratto netto (g/l)	18,05
	Ac. Tartarico (g/l)	1,94
	Ac. Malico (g/l)	1,97

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (**)
MOSTO	Zuccheri (°Babo)	18,80
	pH	3,34
	Acidità totale (g/l)	7,03
	Ac. Tartarico (g/l)	4,87
	Ac. Malico (g/l)	2,51

ANALISI SENSORIALE E DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Buono l'accumulo di zuccheri e l'acidità nel mosto. Dà un vino giallo paglierino con riflessi verdognoli caratterizzato da note agrumate e leggeri sentori floreali. In bocca è equilibrato, mediamente sapido, di corpo leggero e gradevole, buona la tipicità. È adatto alla produzione di vini leggeri e freschi, di pronta beva.





(*) Dati medi relativi al biennio 2010/2011 (**) Dati medi relativi al triennio di osservazione 2009/2011