

Costitutore

CRA- ENC Unità di Ricerca per le Produzioni Enologiche dell' Italia Centrale; CRA-PAV Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 253 del 30/10/2007

Origine

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO		
Ubicazione	-	
Forma di allevamento	-	
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	
Periodo di osservazione	2004-2005	

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria medio-bassa

FASE	ЕРОСА	
FENOLOGICA		
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	I decade Ottobre	

IL GRAPPOLO


Grappolo molto piccolo, compatto, cilindrico



CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,85
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	115
Peso medio acino (g)	1,45
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	25,16
9	рН	3,21
Acidità totale (g/l) Ac. Tartarico (g/l) Ac. Malico (g/l)	Acidità totale (g/l)	7,34
	Ac. Tartarico (g/l)	4,91
	Ac. Malico (g/l)	2,72
VINO	Antociani totali (mg/l)	374
	Polifenoli totali (mg/l)	2.077

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino molto intenso, con ottimi riflessi violacei, profumi tipici della cultivar, soprattutto fruttati, struttura ottima. La percezione acida e amara, non stemperata dalla fermentazione malo-lattica, penalizza in parte il giudizio. Adatto all'invecchiamento medio-lungo.