



Costitutore

Università Cattolica del “Sacro Cuore”- Istituto di Frutti-Viticultura – Facoltà di Agraria sede di Piacenza; ERSAF – Regione Lombardia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 127 del 04/06/2014

Origine

Pietra de Giorgi (PV), Cigognola (PV), Canneto Pavese (PV)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Santa Giuletta (PV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	2849
Periodo di osservazione	2002-2004

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria medio-alta
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiaura	-
Maturazione	-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

CLONE

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO



- 🍇 Grappolo medio-grande, conico, alato
- 🍇 Acino medio, sferoidale



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	0,79
Produzione per ceppo (Kg)	4,77
Numero grappoli/ceppo	18
Peso medio grappolo (g)	260
Peso medio acino (g)	1,74
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	23,86
	pH	3,32
	Acidità totale (g/l)	5,65
	Ac. Tartarico (g/l)	6,17
	Ac. Malico (g/l)	1,91
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE (*)



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino con minore intensità colorante.

(*) Valutazione sensoriale dei vini ottenuti dalle microvinificazioni eseguite nel biennio 2006-2007.

Nel diagramma a “radar” vengono indicate le congiungenti delle valutazioni raggiunte dai principali descrittori esaminati (in senso orario: visivi, olfattivi e gustativi).