



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 171 del 24/07/1987

Origine

Mazzè (TO)

I-CVT TO 29

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caluso (TO)
Forma di allevamento	Pergola
Densità di impianto (ceppi/ha)	850
Periodo di osservazione	1983-1985


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** resistente alla muffa grigia, si presta bene all'appassimento
- ✓ Apice e germoglio con pigmentazione antocianica debole
- ✓ Vigoria medio-elevata
- ✓ Fertilità medio-elevata
- ✓ Produttività elevata e costante

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Leggermente tardiva
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Medio-precocce

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-grande, piramidale, moderatamente compatto, alato; talora ala lungamente pedunculata
- ✿ Acino medio, sferoidale; buccia di colore giallo, con sfumature dorate o rosate se esposta al sole



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
--	--------------

Botrite	Moderata
Oidio	Media

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
---------------------------------------	--------------

Fertilità reale	1,32
Produzione per ceppo (Kg)	16,2
Numero grappoli/ceppo	65
Peso medio grappolo (g)	250
Peso medio acino (g)	2,30
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
---------------------------------	--------------

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	18,9
	pH	2,98
	Acidità totale (g/l)	12,80
	Ac. Tartarico (g/l)	8,80
	Ac. Malico (g/l)	5,10

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore giallo paglierino scarico, con riflessi verdolini, limpido; intensi profumi floreali di fiori d'acacia, e fruttati per la presenza di note di mela verde; al gusto si presenta secco, fresco e sapido.