



Costitutore

Vivai Cooperativi di Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 256 del 02/11/2017

Origine

Az. Vitivinicola Falconieri, S. Giorgio Canavese (TO)

I-VCR 431

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Domenico Bordone, Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento e Portinnesto	Guyot con 9 gemme/pianta; Kober 5BB VCR 102
Densità e Sesto di impianto	5000 ceppi/ha; 0.8 x 2,5 m.
Periodo di osservazione	2010-2012

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria	Buona
✓ Fertilità	Ottima
✓ Produttività	Superiore alla media varietale

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade di Maggio
Invaiaura	III decade di Luglio
Vendemmia (**)	II decade di Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo grande, compatto, cilindrico piramidale, allungato, alato.
- Acino piccolo, sferoide, con buccia di colore giallo dorato, con sfumature rosate o ambrate se esposta al sole, pruinosa.



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE (*)
Botrite	0,67
Oidio	0,83


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)
Fertilità reale media	1,00
Fertilità basale	0,91
Fertilità potenziale	0,94
Produzione per ceppo (Kg)	2,01
Peso medio grappolo (g)	222
Peso medio acino (g)	1,98
Peso legno potatura (g/ceppo)	500
Indice di Ravaz	4,02

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO (*)	Zuccheri (°Babo)	18,6
	pH	3,19
	Acidità totale (g/l di Ac.Tartarico)	7,5
	Ac. Tartarico (g/l)	6,12
	Ac. Malico (g/l)	1,73
VINO (**)	Grado alcool (% vol)	12,55
	Acidità totale (g/l)	7,27
	Acido Tartarico (g/l)	3,22
	Acido malico (g/l)	1,21
	pH	3,27
	Estratto netto (g/l)	18,19

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA E ANALISI SENSORIALE

Dà un vino giallo paglierino, complesso, fine ed armonico. Al naso spiccano i profumi delicati di fiori di campo e della rosa. Il sapore è fresco, le sensazioni sono sostenute dall'accentuata sapidità e il finale richiama i sentori della frutta secca e note leggere di miele. Buona la struttura.

ERBALUCE VCR 431, VCR 432/ERBALUCE STANDARD



(*) Dati medi relativi al triennio di osservazione 2010-2012

(**) Dati medi relativi al biennio 2010/2011