

FREISA N.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Costa Vescovato (AL)

I-VCR 208

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, cilindrico-piramidale, semicompatto, munito di due ali evidenti
- ✚ Acino medio rotondeggiante, a buccia consistente ed uniformemente colorata




**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,17
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,45
Produzione per ceppo (Kg)	2,08
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	180
Peso medio acino (g)	1,62
Peso legno potatura (g/ceppo)	480
Indice di Ravaz	4,33

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	19,80
	pH	3,34
	Acidità totale (g/l)	8,58
	Ac. Tartarico (g/l)	5,15 (*)
	Ac. Malico (g/l)	2,70 (*)
VINO	Antociani totali (mg/l)	701 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2140 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Le uve di questo biotipo conferiscono al vino un gradevole profumo fruttato con note di lampone e frutti di bosco. La buona dotazione di colore e di tannini morbidi lo rende adatto all'ottenimento di vini da consumarsi giovani.

(*) Dati medi relativi alla biennio 2003-2004