

# GRECANICO DORATO B.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

## Origine

Mazara del Vallo (TP)

I-VCR 13

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria contenuta
- ✓ Produzione media
- ✓ Buona la resistenza alle crittogamiche, in particolare all'oidio

<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	II decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio-piccolo, semicompatto, a volte leggermente spargolo
- ✚ Acino medio a buccia consistente



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE  
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1
Oidio	2


**CARATTERISTICHE  
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,57
Produzione per ceppo (Kg)	4,91
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	315,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI  
ENOCHIMICI CLONE (\*)**

<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	16,70
	pH	3,04
	Acidità totale (g/l)	8,37
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

**ANALISI SENSORIALE**



**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Il clone dà vini di buona struttura ed acidità, sapidi e persistenti. Il profilo aromatico evidenzia profumi floreali intensi ed eleganti con particolari note agrumate.

(\*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999