

LAGREIN N.



Costitutore

Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di
Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Bolzano (BZ)

I-Lb 25

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caldaro (BZ)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto	5555
Periodo di osservazione	2003-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo a **Grappolo** corto
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività moderata

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo piccolo, corto, piramidale, alato, semicompatto
- ✿ Acino medio-grosso, sub-elittico



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	Media


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,35
Produzione per ceppo (Kg)	1,7
Numero grappoli/ceppo	11
Peso medio grappolo (g)	180,14
Peso medio acino (g)	2,03
Peso legno potatura (g/ceppo)	383,6
Indice di Ravaz	2,89

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,21
	pH	3,44
	Acidità totale (g/l)	7,27
	Ac. Tartarico (g/l)	7,0
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	2871,67

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore intenso da rosso ciliegia profondo a rosso granato, netti riflessi violacei da vino giovane, con profumo di viole, tipico, di buona complessità, di sapore intenso, di buon corpo e persistenza, con tannini accentuati, leggermente amarognolo sul finale.

Clone adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perchè si affini.