



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Azzano X (PN)

I-ISV-F-V2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monastier (TV); Spresiano (TV); Spilimbergo (PN); Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** leggermente più piccolo
- ✓ Buon equilibrio fisiologico-produttivo e vegetativo
- ✓ Fertilità superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo piccolo, piramidale, mediamente compatto
- ✿ Acino piccolo, rotondeggiante



Botrite	-
Oidio	-

<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>		<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,21
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	8,1
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Per le sue caratteristiche peculiari è indicato come clone da taglio, sia per aumentare l'intensità colorante e l'acidità sia per arricchire il corredo aromatico.