

# MOSCATO GIALLO B.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

## Origine

Campodarsego (PD)

I-VCR 100

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoroso
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Produttività media
- ✓ Resistenza alla botrite buona

### FASE FENOLOGICA

### EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Settembre



## IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo più che medio, semicompatto o semispargolo
- ✚ Acino medio, con buccia fortemente giallo ambrata e consistente


**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE  
CRITTOGAMICHE**

Botrite	-
Oidio	-

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>	<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	5,83
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	240,17
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>	<b>CLONE (*)</b>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	17,43
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	7,83
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

**ANALISI SENSORIALE**



**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Il clone dà vini con aromi e profumi eleganti, fini, da prodursi come spumante dolce.

(\*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999