

NEBBIOLO N.



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio
per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 196 del 23/08/1990

Origine

Neive (CN)

I-CVT CN 230

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	La Morra (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3500
Periodo di osservazione	1983-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo “Lampia” a foglia intera
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività elevata

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Medio-precoce
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Tardiva

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
Botrite	Media
Oidio	Elevata

IL GRAPPOLO


- ✳ Grappolo grande, piramidale allungato, con due o più ali pronunciate, compatto
- ✳ Acino medio-piccolo, ellissoidale corto, pruinoso



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	4,80
Numero grappoli/ceppo	14
Peso medio grappolo (g)	340
Peso medio acino (g)	1,92
Peso legno potatura (g/ceppo)	850
Indice di Ravaz	5,64

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	22,3
	pH	3,06
	Acidità totale (g/l)	10,05
	Ac. Tartarico (g/l)	8,30
	Ac. Malico (g/l)	3,80
VINO	Antociani totali (mg/l)	100 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.020 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore rosso rubino intenso, bouquet floreale (note di viola e rosa) e speziato; elevata alcolicità (13.3 %), acidità contenuta, buona struttura. Idoneo all'invecchiamento.

(*) Dati medi relativi al periodo 1984-1986