

**Costitutore**

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Affi (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Giorgio in Salici (VR); S. Pietro in Cariano (VR)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1976-1978

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** più spargolo
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività contenuta
- ✓ Minore sensibilità alla botrite

FASE	EPOCA
FENOLOGICA	
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	III decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-grande, cilindrico, alato, tendenzialmente spargolo
- ✿ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	

Botrite	
---------	--

Oidio	-
-------	---

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	

Fertilità reale	0,92
-----------------	------

Produzione per ceppo (Kg)	11,7
---------------------------	------

Numero grappoli/ceppo	59
-----------------------	----

Peso medio grappolo (g)	198,1
-------------------------	-------

Peso medio acino (g)	2,11
----------------------	------

Peso legno potatura (g/ceppo)	-
-------------------------------	---

Indice di Ravaz	-
-----------------	---

PARAMETRI	CLONE
ENOCHIMICI	

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	16,51
	pH	3,11
	Acidità totale (g/l)	10,7
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; profumo delicato; acidità piuttosto sostenuta, liscio, gradevole.