

VERDICCHIO BIANCO B.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

S. Bonifacio (VR)

I-VCR 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Ubicazione | Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI) |
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Guyot |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | 1998-2000 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo “Trebbiano di Soave”
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività leggermente inferiore e costante
- ✓ Buona la resistenza alla botrite e all’oidio

FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|-----------------|---------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiatura | II decade Agosto |
| Maturazione (*) | II decade Settembre |

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, semicompatto
- ✚ Acino più che medio, con buccia abbastanza consistente



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

| | |
|---------|-----|
| Botrite | 1,0 |
| Oidio | 2,5 |


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

| | |
|-------------------------------|--------|
| Fertilità reale | 1,34 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 4,15 |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | 308,67 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE (*)**

| | | |
|--------------|----------------------|-------|
| MOSTO | Zuccheri (Babo) | 17,37 |
| | pH | 3,10 |
| | Acidità totale (g/l) | 9,53 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGAOLETTICA

Vino di elevata struttura fruttati, da invecchiamento. Si presta all'uvaggio apportando notevole complessità aromatica.

(*) Dati relativi al triennio 1997-1999