



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per
il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 295 del 19/12/1994

Origine

Castagnole M.to (AT)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Castagnole M.to (AT)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	4000
Periodo di osservazione	1983-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria medio-elevata
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività medio-elevata
- ✓ Moderata suscettibilità verso la peronospora

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

Media

Fioritura

Medio-precoce

Invaiaatura

Media

Maturazione

Medio-precoce

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite

Media

Oidio

-

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, piramidale allungato, con un'ala, compatto
- ✿ Acino medio, ellissoidale, molto corto, molto pruinoso



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	2,0
Produzione per ceppo (Kg)	4,9
Numero grappoli/ceppo	23,3
Peso medio grappolo (g)	210
Peso medio acino (g)	1,66
Peso legno potatura (g/ceppo)	720
Indice di Ravaz	6,8

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,2
	pH	3,25
	Acidità totale (g/l)	5,40
	Ac. Tartarico (g/l)	6,35
VINO	Ac. Malico (g/l)	1,32
	Antociani totali (mg/l)	170 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.280 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso granato intenso; all'olfatto emergono note di rosa e di spezie, in particolare di liquirizia, e qualche nota fruttata; al gusto si presenta giustamente acido, con buon corpo e discreta persistenza.

(*) Dati medi relativi al periodo 1984-1986