

CORVINONE N.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

San Pietro in Cariano (VR)

I-VCR 18

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Ubicazione | Rauscedo (PN), Città Sant'Angelo (PE) |
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Sylvoz |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 1900 |
| Periodo di osservazione | 1991-1993 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Famiglia delle “Corvine”
- ✓ Vigoroso
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Fertilità totale buona-media
- ✓ Ottima la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|-----------------|---------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiaura | II decade Agosto |
| Maturazione (*) | II decade Settembre |

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, non compatto, tronco-piramidale, alato
- ✿ Acino ovoidale, medio, di colore uniforme



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE**

| | |
|--------------|------|
| Botrite (**) | 3,22 |
| Oidio (***) | 5,22 |

**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Fertilità reale | 1,39 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 10,90 |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | 262 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

**PARAMETRI CLONE (*)
ENOCHIMICI**

| | | |
|--------------|--------------------------|------|
| MOSTO | Zuccheri (Babo) | 16,3 |
| | pH | 3,14 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,3 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |
| VINO | Antociani totali (mg/l) | - |
| | Polifenoli totali (mg/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini fruttati-floreali, caratterizzati da intensi sentori di frutti rossi, fruttato maturo, viola nonché speziato e balsamico, di pronta beva. Si presta all'uvaggio per la produzione del Recioto e dell' Amarone, data la complessità del profilo aromatico.

(*) Dati medi relativi al triennio 1992-1994; Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (**) e Città Sant'Angelo (PE) (***)