

# TREBBIANO ABRUZZESE B.



## Costitutore

Università degli Studi di Bari - DiBCA – Dipartim.di  
Biologia Chimica Agro-Forestale ed Ambientale;  
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in  
Abruzzo

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

## Origine

Pianella (PE)

I-UBA-RA TR 27

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ubicazione                     | Casacanditella (CH); Vittorito (AQ)             |
| Forma di allevamento           | Controspalliera con potatura a Guyot bilaterale |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 2666                                            |
| Periodo di osservazione        | 1998-2003                                       |

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di dimensioni leggermente inferiore
- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità lievemente inferiore
- ✓ Produttività media

## SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

|         | CLONE |
|---------|-------|
| Botrite | 11    |
| Oidio   | 12    |

## IL GRAPPOLO

- ✳ Grappolo medio-grande, piramidale, a volte alato, medio-lungo, mediamente compatto, peduncolo medio
- ✳ Acino medio-grande, rotondo, con buccia di colore verde-giallo




| <i><b>FASE FENOLOGICA</b></i> | <i><b>EPOCA</b></i>                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Germogliamento                | Medio-tardiva (III decade Aprile)    |
| Fioritura                     | Medio-tardiva (I decade Giugno)      |
| Invaiaatura                   | Medio-tardiva (III decade Agosto)    |
| Maturazione                   | Medio-tardiva (III decade Settembre) |

| <i><b>CARATTERISTICHE<br/>PRODUTTIVE</b></i> | <i><b>CLONE</b></i> |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Fertilità reale                              | 1,36                |
| Produzione per ceppo (Kg)                    | 8,86                |
| Numero grappoli/ceppo                        | 21,09               |
| Peso medio grappolo (g)                      | 420                 |
| Peso medio acino (g)                         | 2,50                |
| Peso legno potatura (g/ceppo)                | 1.130               |
| Indice di Ravaz                              | 7,84                |

|              | <i><b>PARAMETRI<br/>ENOCHIMICI</b></i> | <i><b>CLONE</b></i> |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>MOSTO</b> | Zuccheri (°Brix)                       | 19,30               |
|              | pH                                     | 3,20                |
|              | Acidità totale (g/l)                   | 5,48                |
|              | Ac. Tartarico (g/l)                    | 5,13                |
|              | Ac. Malico (g/l)                       | 0,94                |

## ***ANALISI SENSORIALE***



---

## **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

---

La produttività relativamente elevata del clone ha consentito di ottenere caratteristiche enologiche piuttosto buone, lievemente migliori di quelle medie di riferimento soprattutto per l'alcool.

I vini sono di colore giallo paglierino un po' scarico, caratterizzati da buon estratto (17,10 g/l) e da discreta dotazione polifenolica.

L'analisi sensoriale ha evidenziato un complesso bouquet in cui spiccano i profumi florali, fruttati (agrumi) e di vegetale secco, con note speziate. Al palato i vini si presentano ben strutturati, con acidità medio-bassa, mediamente persistenti e debolmente amari.