

# REGINA B.



## Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,  
Conegliano (TV)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

## Origine

Province di Bari e Foggia

6 ASI-I  
I-ISV 9

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1973-1976

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Acino** con buccia più consistente e polpa piuttosto succosa
- ✓ Produttività buona e costante

## FASE


## EPOCA

### FENOLOGICA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo grosso, cilindrico, mediamente compatto, alato, con peduncolo visibile semilegnoso
- ✚ Acino grosso, di forma da sferica ad ovoidale; buccia di medio spessore, di colore verde-giallastro; polpa da croccante-carnosa a succosa



---

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**  
**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

---

---

**CARATTERISTICHE CLONE**  
**PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	0,88
Produzione per ceppo (Kg)	17,8
Numero grappoli/ceppo	44,8
Peso medio grappolo (g)	397,4
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

---

---

**PARAMETRI CLONE**  
**ENOCHIMICI**

<b>MOSTO</b>	Zuccheri (°Brix)	14,90
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	9,51
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

---

---

**ANALISI SENSORIALE**

---

---

**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

---