

**SCHEDA
INCOMPLETA**
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura di
Conegliano (TV);
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 295 del 19/12/1994

Origine

Trinitapoli (BA)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	-

IL GRAPPOLO

Medio-grande, tronco-piramidale.

● **ACINO:** grande, sferoide.

▼ **VINACCIOLI:**



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo** di peso medio superiore

✓ Fertilità media

✓ Produzione ottima e costante

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Media

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI	CLONE	PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO	CLONE
Fertilità reale	-	Zuccheri (°Brix)	-
Produzione (Kg/ceppo)	-	pH	-
N° grappoli/ceppo	-	Acidità totale (g/l)	-
Peso medio grappolo (g)	-	Grado di spedicellamento	(*)
Peso medio acino (g)	-	(gr)	
Peso legno potatura (g/ceppo)	-	Forza di schiacciamento	(*)
Indice di Ravaz	-	(gr/cm ²)	

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Il clone richiede climi temperato-caldi e si adatta ai diversi sistemi di allevamento.

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Il clone manifesta una resistenza media nei confronti della botrite e dell'oidio.

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

(*) Il clone presenta un indice di distacco e di schiacciamento leggermente superiore alla media.