

# SCHIAVA GROSSA N.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 258 del 04/11/1996

## Origine

Località Ceniga, Dro (TN)

I-VCR 14

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); San Benedetto del Tronto (AP)
Forma di allevamento	Casarsa
Portinnesto	S.O.4 e Kober 5BB
Sesto e Densità di impianto	2700 (ceppi/ha)
Periodo di osservazione	1992-1994
Testimone di riferimento	Standard varietale

## IL GRAPPOLO

Piccolo, piramidale, alato, tendenzialmente spargolo.

- **ACINO:** grosso, rotondeggiante, di colore uniforme.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** molto più piccolo
- ✓ Apice del germoglio giallo dorato
- ✓ Vigoria e Fertilità media
- ✓ Produzione media e relativamente costante
- ✓ Ricchezza in zuccheri superiore
- ✓ Resistenza alla botrite ottima

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA (*)</i>	<i>EPOCA (**)</i>
Germogliamento	II decade Aprile	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre	II-III decade Settembre

<i>PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI</i>	<i>CLONE (*)</i>	<i>CLONE (**)</i>
Fertilità reale	1,09	1,11
Produzione (Kg/ceppo)	3,84	4,04
N° grappoli/ceppo	21,8	22,3
Peso medio grappolo (g)	176,33	181,17
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-	-
Indice di Ravaz	-	-

<i>PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO</i>	<i>CLONE (*)</i>	<i>CLONE (**)</i>
Zuccheri (Babo)	15,7	19,1
pH	3,27	3,36
Acidità totale (g/l)	7,58	7,07
Grado di spedicellamento (gr)	-	-
Forza di schiacciamento (gr/cm <sup>2</sup> )	-	-

(\*) Località Rauscedo. Media del clone sui due portinnesti.

(\*\*) Località San Benedetto del Tronto . Media del clone sui due portinnesti.

---

### ***RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI***

---

Si è ritenuto opportuno rilevare la botrite a Rauscedo e l'oidio a San Benedetto del Tronto, in considerazione delle diverse condizioni ambientali favorevoli all'una o all'altra delle due malattie: percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta.

L'incidenza media delle malattie è risultata essere pari a 2,77 % per la botrite e 3,10 % per l'oidio.

---

### ***UTILIZZAZIONE***

---

Clone a duplice attitudine. L'uva si presta anche al consumo fresco.