

SCHIAVA GROSSA N.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 291 del 12/12/1996

Origine

Località Ceniga, Dro (TN)

I-VCR 25

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); San Benedetto del Tronto (AP)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Portinnesto	S.O.4 e Kober 5BB
Sesto e Densità di impianto	2700 (ceppi/ha)
Periodo di osservazione	1992-1994
Testimone di riferimento	Standard varietale

IL GRAPPOLO

Medio, piramidale, munito di corte ali, semicompatto.

- **ACINO:** grosso, rotondeggiante, omogeneo, di colore intenso uniforme.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Maturazione omogenea
- ✓ Ricchezza in zuccheri superiore
- ✓ Resistenza alla botrite buona

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA (*)</i>	<i>EPOCA (**)</i>
Germogliamento	II decade Aprile	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre	II-III decade Settembre

<i>PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI</i>	<i>CLONE (*)</i>	<i>CLONE (**)</i>
Fertilità reale	1,25	1,26
Produzione (Kg/ceppo)	7,69	7,97
N° grappoli/ceppo	25	25,2
Peso medio grappolo (g)	306,83	316,67
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-	-
Indice di Ravaz	-	-

<i>PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO</i>	<i>CLONE (*)</i>	<i>CLONE (**)</i>
Zuccheri (Babo)	15,00	18,23
pH	3,34	3,27
Acidità totale (g/l)	7,53	6,83
Grado di spedicellamento (gr)	-	-
Forza di schiacciamento (gr/cm ²)	-	-

(*) Località Rauscedo. Media del clone sui due portinnesti.

(**) Località San Benedetto del Tronto . Media del clone sui due portinnesti.

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Si è ritenuto opportuno rilevare la botrite a Rauscedo e l'oidio a San Benedetto del Tronto, in considerazione delle diverse condizioni ambientali favorevoli all'una o all'altra delle due malattie: percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta.

L'incidenza media delle malattie è risultata essere pari a 3,88 % per la botrite e 3,99 % per l'oidio.

UTILIZZAZIONE

Clone a duplice attitudine.