



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 106 del 07.05.2022

Origine: Trinitapoli (FG)

I-VCR 139

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Trinitapoli (FG)
Forma di allevamento	Tendone
Portinnesto	Kober 5BB
Sesto e Densità di impianto	2,5 m x 2,5 m; 1600(ceppi/ha)
Periodo di osservazione	2012-2014
Testimone di riferimento	Popolazione di Carati B.

IL GRAPPOLO

GRAPPOLO: di forma piramidale, semicompatto e alato, di dimensioni leggermente inferiori allo standard

● **ACINO:** medio, ovoidale, con buccia sottile di colore giallo-verde

● **VINACCIOLI:** assenti



CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo:** di dimensioni leggermente inferiori

✓ **Acino:** medio

✓ **Vigoria:** media

✓ **Fertilità:** superiore

✓ **Produttività:** media

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

I decade Aprile

Fioritura

I decade Giugno

Invaiaura

II decade Luglio

Maturazione

I decade Agosto

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI

CLONE (*)

Fertilità reale	1,03
Produzione (Kg/ceppo)	16,6
N° grappoli/ceppo	36,8
Peso medio grappolo (g)	451
Peso medio acino (g)	3,83
Peso legno potatura (g/ceppo)	2720
Indice di Ravaz	6,07

PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO

CLONE (*)

Zuccheri (°Brix)	15,33
pH	3,42
Acidità totale (g/l)	4,83
Grado di spedicellamento (gr)	225
Forza di schiacciamento (gr/cm ²)	1699

TECNICHE COLTURALI E ADATTAMENTO A CONDIZIONI PEDO-AMBIENTALI

Predilige climi caratterizzati da estati calde e inverni miti, con scarse precipitazioni; può richiedere l'utilizzo di fitoregolatori per stimolare la crescita delle bacche.

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Il clone ha mostrato sensibilità a peronospora e oidio nella media della popolazione

UTILIZZAZIONE

Il biotipo selezionato presenta parametri fenologici in linea con la varietà; il grappolo è di forma piramidale, semicompatto e alato, di dimensioni leggermente inferiori allo standard; l'acino è medio, ovoidale, con buccia sottile di colore giallo-verde. Vigoria e produzioni restano fedeli alla media, la fertilità invece risulta superiore. Il contenuto zuccherino è elevato rispetto alla media varietale e dona a quest'uva un sapore gradevolmente dolce e sapido; inoltre la buona croccantezza della polpa e l'assenza di semi, rendono il biotipo particolarmente adatto al consumo fresco.

(*) Dati medi relativi al triennio 2012-2014