


SVATOVA VRINECKE N.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 23/07/2011

Origine

Rep. Ceca - Moravia

I-VCR 225

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2005-2007

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di dimensioni inferiori
- ✓ Vigoria media, con vegetazione assurgente
- ✓ Produzione leggermente inferiore
- ✓ Ottima dotazione di antociani

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	III decade Luglio
Maturazione	I decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, cilindrico-piramidale, semicompatto
- ✿ Acino medio-piccolo, sferoide, a buccia consistente e uniformemente colorata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	1,00
Oidio	0,67


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,70
Produzione per ceppo (Kg)	3,02
Numero grappoli/ceppo	17
Peso medio grappolo (g)	178
Peso medio acino (g)	1,65
Peso legno potatura (g/ceppo)	580
Indice di Ravaz	5,21

PARAMETRI CLONE ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,90
	pH	3,34
	Acidità totale (g/l)	6,60
	Ac. Tartarico (g/l)	5,57
	Ac. Malico (g/l)	2,42
VINO	Antociani totali (mg/l)	471 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.330 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2005-2006

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso con sfumature violacee; al naso richiama i frutti rossi, in particolare la ciliegia e il ribes nero; di medio corpo, pieno, con tannini morbidi e vellutati, da bersi giovane o dopo un breve periodo di affinamento.