



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 189 del 09-08-2021

Origine : Villa Robledo - SPAGNA

Periodo di osservazione: 2017-2019

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Az. Agr. Fossalón- Fossalón di Grado (GO)
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Vigoria: elevata

Fertilità: superiore alla media

Produttività: superiore alla media

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo: grande, spargolo o semi-spargolo, di forma conica, con due o più ali sviluppate
- ✿ Acino: medio-grande, sferico, con buccia di colore giallo-verde



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	0,79
Oidio	0,82


<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,25
Produzione per ceppo (Kg)	5,76
Numero grappoli/ceppo	10,0
Peso medio grappolo (g)	576
Peso medio acino (g)	2,94
Peso legno potatura (g/ceppo)	980
Indice di Ravaz	5,86

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO*	Zuccheri (° Brix)	21,67
	pH	3,23
	Acidità totale (g/l)	6,77
	Ac. Tartarico (g/l)	5,21
	Ac. Malico (g/l)	3,60

* Dati medi relativi alle 3 annate 2017-19

ANALISI SENSORIALE

I vini che si ottengono sono di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; al naso hanno un profilo aromatico ampio e delicato, dove risaltano sentori di frutta a pasta gialla, accompagnati da lievi richiami di fiori d'acacia e di agrumi. In bocca è leggero, fresco, equilibrato con una moderata sapidità.



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il biotipo selezionato si caratterizza per un profilo aromatico particolarmente interessante, oltrechè per la persistenza e gradevolezza; è adatto alla produzione di vini da bersi giovani o per la trasformazione in brandy.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Tollerante nei confronti della siccità; è moderatamente sensibile all'oidio e alla botrite, in linea con la media varietale.